



PETROKIMIA KAYAKU

Herbisida

Presulor®

20 / 280 OD

Herbisida sistemik selektif berbentuk larutan dalam minyak untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput pada tanaman padi.

Bahan aktif :

bensulfuron-metil : 20 g/l

pretilaklor : 280 g/l

PETUNJUK PENGGUNAAN



KOMODITAS	TARGET SASARAN	DOSIS FORMULASI
Padi Sawah	Gulma berdaun lebar <i>Ludwigia octovalvis</i> <i>Monochoria vaginalis</i>	1-2 l/ha
	Gulma golongan rumput <i>Echinochloa crus-galli</i>	1-2 l/ha
	Teki <i>Cyperus iria</i>	1-2 l/ha
CARA DAN WAKTU APLIKASI	Penyemprotan volume tinggi. Lakukan penyemprotan pada saat gulma sedang tumbuh aktif.	
	Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, diperkirakan hujan tidak akan turun 6 jam setelah penyemprotan.	

Keterangan :


1. Gunakan dosis sesuai anjuran.
2. Gunakan air/lapangan yang tidak mengandung partikel tanah. Sebagai ukuran, masukkan tangan ke dalam air itu, bila tangan masih terlihat air tersebut dapat digunakan.
3. Lakukan penyemprotan dengan merata.



Keunggulan Presulor 20/280 OD

- Herbisida untuk biji gulma pada tanaman padi.
- Efektif menekan populasi gulma sampai dengan 30 Hari.
- Dapat diaplikasikan pada lahan yang basah.
- Aman bagi tanaman utama.

Padi Tabela (Tanam Benih Langsung)



28 hari **setelah aplikasi** Presulor 20/280 OD



28 hari **tanpa aplikasi** Presulor 20/280 OD

Teknik Aplikasi Presulor 20/280 OD

- Gunakan nozzle kasar.
- Fase gulma sejak biji, dengan maksimal kondisi gulma maksimal 2 daun (tinggi < 5 mm).
- Kondisi lahan basah (tergenang 3-5 cm lebih baik).
- 3-1 hari sebelum tabela dan 0-5 hari setelah tabela.



Ludwigia octovalvis



Monochoria vaginalis



Echinochloa crus-galli



Cyperus iria

